




Landelijk Coördinatiecentrum  
Patiënten Spreiding

# TECHNISCHE BRIEFING TWEEDE KAMER

Ernst Kuipers, voorzitter LNAZ


3-11-2021




Bron: RIVM 30-10-2021




**Beloof in de tijd** | Besmettingen leiden tot ziekenhuisopnames.  
Ziekenhuisbezetting is resultante van opnames en ontslagen




# Klinische en IC opnames | 1 november '20 t/m 2 november '21 obv 3-daagse gemiddeldes




# Covid Kliniek + IC bezetting | 8 maart 2020 t/m 2 november 2021




# Klinische covid bezetting ROAZ regio ZWN | 3 okt t/m 2 november '21



# Capaciteit en bezetting IC



# Landelijk beeld van de verdeling van IC-patiënten volgens de fair share in relatie tot de bovenregionale patiëntverplaatsingen





landelijk netwerk  
acute zorg

## Terugkijken en vooruitblikken op COVID-19

oktober 2021



landelijk netwerk  
acute zorg

## Opschalingsplan COVID-19

versie 1.1 oktober 2021



## Klassen van urgentie van klinische zorg



| Klasse        |                               | Definitie in dit document                                                                                      | Termijn van zorg |
|---------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Klasse 1 en 2 | <i>Semi-acute zorg</i>        | Zorg noodzakelijk, zeer hoog risico op gezondheidsschade dan wel verlies van levensjaren bij uitstel > 1 week. | < 1 week         |
| Klasse 3      | <i>Kritieke planbare zorg</i> | Aanmerkelijk risico op permanente gezondheidsschade dan wel verlies van levensjaren bij uitstel > 6 weken.     | < 6 weken        |
| Klasse 4      | <i>Overig planbare zorg</i>   | Enig risico op permanente gezondheidsschade dan wel verlies van levensjaren bij uitstel > 6 weken.             | > 6 weken        |
| Klasse 5      | <i>Overig planbare zorg</i>   | Geen permanente gezondheidsschade dan wel verlies van levensjaren bij uitstel te verwachten.                   | > 6 weken        |



# LCPS

Landelijk Coördinatiecentrum  
Patiënten Spreiding